

# RAHİM AĞZI KANSERİ




Dünyada **iki dakikada** bir,  
**1 kadın** rahim ağzi kanserinden ölüyor

Dünya çapında **45 yaş** altı kadınlarda  
En sık görülen **2**'inci,  
Ölüme sebep olan **3**'üncü kanser türü

Türkiye'de  
Rahim Ağzi Kanserini  
En sık görülen **8**'inci  
kanseri türü

## HPV nasıl bulaşır?

- HPV oldukça yaygındır.
- Cinsel temasla kolayca geçebilir.
- Cinsel yönden aktif kadınların **%80'e** varan bölümü yaşamlarının bir anında, bir HPV tipiyle enfekte olur.



## Neden olur?

- **HPV** (*Human Papilloma Virus*) denen bir virüs sebep olur.
- HPV'nin **100**'den fazla HPV tipi var.
- Vakaların çoğuna iki tip HPV (**HPV 16 VE 18**) neden olur.

## Nasıl korunmak gerekir?

- Tarama programları, rahim ağzi kanserinin azalmasında önemli bir etkiye sahip
- Yıllık jinekolojik muayene
  - Pap-Smeer Testi
  - HPV Aşısı



## Risk Faktörleri

- Erken yaşta cinsel ilişkiye başlama
- Cinsel ilişkiye girilen kişinin çok eşli olması
- Sigara içmek
- Bağışıklık sistemini etkileyen bir sağlık sorunu
- Uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımı (5 yıl ve daha fazlası)
- Fazla doğum sayısı (3 ve üzeri)

## Pap-Smeer Testi

- 1** Jinekolojik muayene sırasında yapılır.
- 2** Rahim ağzına bir sürüntü yapılarak hücre örneği alınır.
- 3** Örnek mikroskop altında incelenir.
- 4** **21** yaşından itibaren düzenli olarak yapılması önerilir.

## HPV Aşısı

- Rahim ağzi kanserlerinin yaklaşık **%70-75**'ine sebep olan HPV tiplerine (Tip 16, 18, ) karşı koruyucudur.
- Hiç cinsel birliktelik yaşamamış kişileri en etkin şekilde korur
- **Dünya Sağlık Örgütü** (WHO) de **9-13** yaş arası kızların aşılmasını önerir.



## Dikkat:

- Aşı,
- HPV enfeksiyonunu ya da HPV bağlantılı kanseri tedavi etmez.
  - Tarama programlarının yerine geçmez.
  - Aşı yapılsa bile tarama programları devam etmek gerekir.



ASIK OLMADAN  
**ASİ** **L**